

GANGRENA SECA ASOCIADA A SALMONELOSIS EN TERNEROS

Oscar Araya*

RESUMEN

Se reporta un brote de necrosis de cola, orejas y extremidades en terneros.
Exámenes séricos han dado títulos positivos a Salmonella spp.

Se reporta un brote de necrosis de cola, orejas y extremidades en terneros overo negro europeo de aproximadamente 1 y medio a 2 meses de edad. De un total de 168 animales que estaban en un sistema de crianza artificial, alimentados con leche entera y concentrado, 12 presentaron el cuadro en un período de aproximadamente 15 días.

El cuadro clínico se caracterizó por gangrena de orejas, cola y extremidades. En un período de 15 a 20 días los animales se apoyaban en los tarsos y se producía desprendimiento de estas partes del cuerpo, con una zona claramente delimitada, la que estaba fría y en la cual se producía desprendimiento total de miembros, quedando sólo restos de muñones parcialmente cicatrizados.

Los animales estaban decaídos, pero conservaban el apetito; tenían una temperatura corporal entre 39 y 40°C.

La anamnesis indicó que todos los terneros habían presentado diarrea muy líquida y de mal olor aproximadamente 2 semanas antes de la presentación del cuadro.

Se efectuó exámenes séricos de anticuerpos para Salmonella dublin, los que dieron títulos positivos en 2 animales examinados.

Posteriormente se ha observado el cuadro, en condiciones similares, en otros animales, todos los que han dado títulos positivos a Salmonella spp.

SUMMARY

DRY GANGRENE ASSOCIATED WITH SALMONELLOSIS IN CALVES. Cases of necrosis of tail, ears and extremities are reported. Serological tests indicate positive titles to Salmonella.

* Med. Vet. PhD Inst. C. Clínicas Veterinarias. Universidad Austral de Chile.