

Equipo: Montesino, Ignacio¹
Queirolo, Luis²
Videla, Pablo³
Garnero, Oscar³

TUMOR DE OJO Y ANEXOS

1. Inyección de Combelen al 1% c.c. cada 100 k. de peso vivo intramuscular
2. Inyección subcutánea alrededor del ojo, de anestésico local al 2%.
Puede intentarse técnica de Paterson de anestesia regional
3. Extirpación del globo ocular y párpados sin mayor preocupación anatómica pero considerando en extraer la totalidad del tejido tumoral y lavado con agua oxigenada.
4. Sutura continua, con cierre completo de la abertura.
5. Aplicación de un antibiótico en la cavidad, prefiriendo pomos de uso en mastitis.

¹ Médico Veterinario - PERU

² Médico Veterinario - URUGUAY

³ Médico Veterinario - ARGENTINA

CALLO INTERDIGITAL

1. Inyección de xilacina al 2% intramuscular, 1 c.c. cada 100 kilos peso vivo para lograr la posición de decubito.
2. Inyección intravenosa, en vena del miembro en cuestión a la altura del metatarso, de lidocaína al 2%.
3. Extracción del callo interdigital tratando de extirpar la totalidad del tejido neoformado. No se sutura.
4. Aplicación de tintura de Cloranfenicol y vendaje.

TUMOR PAPILOMATOSO EN PENE

1. Inyección de xilacina al 2%, 1 c.c. cada 100 kilos de peso vivo.
2. Extracción manual del pene.
3. Extirpación del tumor, sin sutura posterior, pero haciendo leve compresión para evitar amplia hemorragia. Cuidar no lesionar la uretra.
4. Aplicación de antibiótico local y general.
5. Reintroducción del pene.

* * *