

DIAGNOSTICO: Tumor en pene de toro.-

ANESTESIA: Rompum al 2%.Intramuscular 1 c.c. cada 100 Kgs.
p.v.

TECNICA: Extirpación total del tumor.Suturar con Dexon No.1
la mucosa.Aplicación de antibióticos locales.Realizar
sutura en tabaquera en boca prepucial, que se
retira a los 7 días.-

DIAGNOSTICO: Sesiones irreversibles en córnea, de aspecto
maligno.-

ANESTESIA: Regional con hostacáina.-

TECNICA: Extirpación total del globo ocular y anexos.Sutura
de hilo 00 a puntos continuos.Aplicación de antibió-
ticos locales.-

----0----

DIAGNOSTICO:Fractura de extremo inferior del metatarso iz-
quierdo.Presencia de fístula secuestros óseos,
procesos infecciosos y miasis.-

ANESTESIA: Rompum 1 c.c. cada 100 kg p.v.-

TECNICA OPERATORIA:Ampliación a cruz de la abertura exter-
na de la fístula.Extirpación de los secuestros.
Curetaje y limpieza.Taponamiento y vendaje com-
presivo para detener la hemorragia.Antibióticos
local y general.-

DIAGNOSTICO:Tumor de labio izquierdo y extremo inferior de
la vulva.Aspecto maligno.-

ANESTESIA: Histocáina 7 c.c. al 2% epidural baja.Operación
en pie.Extirpación y sutura con Dexon No.1.In-
tento de lograr aspecto estético adecuado.-

----0----